

ETABLERING AF KLØVERGRÆS I AUGUST

I august er jorden varm og hvis jordfugten er til stede, opnås der en god, hurtig og ensartet fremspiring af kløvergræsblandinger. Bedrifter, der udbringer husdyrgødning fra 2,3 DE/ha, må kun pløje græsarealer i omdrift fra 1. marts til 1. juni, hvorfor etablering af græsmarker i august ofte ikke er muligt i praksis for de nævnte bedrifter.

Få en sikker etablering

De seneste år har der været gode erfaringer med etablering af kløvergræs i sensommeren – især ved tidlig såning. Resultater fra Landsforsøgene har vist, at der var hele 1.200 FE/ha mere at hente ved såning i renbestand i begyndelsen af august frem for såning en måned senere med dæksæd.



Følgende har betydning for at sikre en god etablering:

- Jo før i august des bedre, kløver skal helst sås inden 20. august
- Fugtighed i jorden er nødvendig for fremspiring
- Hurtig arbejdsgang med pløjning, pakning og såning – gerne i løbet af få timer for at bevare jordens fugtighed
- Udlægget skal sås på fast tromlet jord i ca. 1 cm dybde
- Rillesåning med alm. såmaskine giver ofte bedre resultat end frøsåkasse
- Udsædsmængde af kløvergræs er ca. 30-35 kg/ha (man anbefaler at øge udsædsmængden med 25% i fht. forårssåning i dæksæd)
- Humusrige jordtyper er ikke egnede p.g.a. risiko for opfrysning af udlægget

Renbestand eller med dæksæd?

Nedenstående viser de generelle anbefalinger om, hvorvidt der skal dæksæd med eller ej.

Såtidspunkt	Anbefales udlægget sået
1. – 15. aug.	i renbestand
15. – 31. aug.	med 30-60 kg* vinterhvede pr. ha
Efter 1. sept.	Usikker mht. kløvers overvintring, rene græsblandinger kan fortsat sås

*ca. 30 kg ved såning midt august og ca. 60 kg i slutningen af august



Dæksæden anvendes bl.a. for at beskytte udlægget mod vind og tidlig frost. Vinterhvede som dæksæd har ikke påvirket foderværdien negativt i 1. og efterfølgende slæt.

Frøblandinger

Man vil typisk vælge den samme frøblanding som ved såning om foråret. Vær dog opmærksom på, at rajsvingel generelt har en lidt langsommere fremspiring end alm. rajgræs, derfor anbefales frøblandinger med rajsvingel ikke sået for sent.

Øvrigt

- Vær opmærksom på at der er risiko for angreb af bladrandbiller på de små kløverplanter og for angreb af fritfluer på græsplanter i 1½-2 bladstadiet.
- Ved såning i begyndelsen af august kan græsset nå at vokse så meget, at en afpudsning inden vinter er nødvendig. Mængden vil ofte være for lille til at ensilere. Græsset må ikke være over 6-7 cm inden vinteren - af hensyn til risiko for sneskimmel.

